Preparação para colonoscopia — PLENVU® (exame de manhã)



INFORMAÇÕES GERAIS

ADQUIRA NA FARMÁCIA o produto PLENVU® (não precisa de receita)

Para que o exame tenha sucesso, o intestino terá de estar completamente limpo, sem vestígios de fezes.

Para que a limpeza intestinal seja eficaz, deve seguir corretamente as seguintes instruções:

1

DIETA: POBRE EM FIBRAS NOS 5 DIAS ANTERIORES AO EXAME

NÃO PODE INGERIR

Frutas, legumes e verduras, cereais com casca, sementes, nem crus nem cozinhados

IMPORTANTE

Reforçar a ingestão de líquidos

- <u>NOTA IMPORTANTE</u>: Se for habitualmente **obstipado(a)** (prisão de ventre) ou se tiver realizado uma **colonoscopia** prévia com **preparação intestinal inadequada,** deverá adquirir, adicionalmente, o medicamento laxante de venda livre **bisacodilo** (ex. Dulcolax[®]) e fazer 1 ou 2 comprimidos nas 3 noites anteriores ao exame.

Se tomar ferro oral deve suspender 6 dias antes do exame.

7

DIA ANTERIOR AO EXAME

<u>Não poderá ingerir mais nenhum alimento sólido</u>. Poderá apenas ingerir <u>líquidos</u> transparentes: água, chá açucarado, sumos de fruta sem polpa, refrigerantes, bebidas isotónicas, café sem leite e canja ou caldos de carne sem resíduos (coados). Adicionalmente, poderá ingerir <u>gelatinas</u> de cor clara (ananás, laranja, limão, pêssego). Não ingira outros produtos, tais como suplementos alimentares, mesmo que propostos na Farmácia.

3

LIMPEZA INTESTINAL (leia também a bula do produto mas siga o plano proposto a seguir)

DIA ANTERIOR AO EXAME

1ª dose às 18h



- Tarde da véspera (pelas 18h): Tomar a saqueta A, dissolvendo em 500mL de água fresca e bebendo ao longo de 45minutos. Tente beber um copo a cada 10 a 15 minutos. De seguida, beba no mínimo, mais 500mL de líquidos transparentes.
- Se sentir náuseas pode diminuir o ritmo de ingestão.
- Entre as duas doses poderá continuar a ingerir líquidos.

DIA ANTERIOR AO EXAME

2ª toma às 22horas



- Noite da véspera (pelas 22horas): Tomar a saqueta A com a saqueta B, dissolvendo em 500mL de água fresca e bebendo ao longo de 45minutos. Tente beber um copo a cada 10 a 15 minutos. De seguida, beba no mínimo, mais 500mL de líquidos transparentes.
- Até à hora de deitar, poderá continuar a ingerir **líquidos transparentes**
- NÃO PODERÁ INGERIR <u>NADA</u> NO MÍNIMO 2 a 3 HORAS ANTES DO EXAME!

NOTA: A qualidade deste exame depende do **cumprimento rigoroso** da preparação intestinal.